

Preparació Colonoscòpia (EVACUANTE Lainco simple®/ Casenglicol: 4 sobres)

En què consisteix la preparació de la prova?

La preparació amb EVACUANTE LAINCO simple®/ CASENGLICOL s'utilitza per netejar l'aparell digestiu abans d'una exploració colorectal (endoscòpia, biòpsia, etc), diagnòstic radiològic (ènemes, pielografies, etc) o cirurgia de còlon. El preparat és un laxant que provoca una neteja mecànica del còlon.



Quina preparació heu de fer?

En primer lloc, cal dissoldre el contingut d'un sobre en un litre d'aigua. Remenar fins a la seva dissolució total.

✓ Quan s'ha de prendre?

- Si la prova és al matí, abans de les 14:00h, cal començar a prendre el preparat el dia abans, a partir de les 20h
- Si la prova és a la tarda, a partir de les 14:00h, cal prendre el preparat el mateix dia de la prova a partir de 6:00h del matí

✓ Com s'ha de prendre?

S'ha de beure un got ple (250 ml) de la solució cada 10-15 minuts, fins a completar els 4 sobres.



Quines recomanacions heu de seguir?

- ✓ Si vostè és diabètic, ha de seguir també el full d'instruccions per a pacients diabètics.
- ✓ Perquè sigui més agradable de prendre, prepari la solució amb aigua freda.
- ✓ Durant els 3 dies abans de l'exploració, cal que faci una dieta sense residus ni fibra.
 - **Pot prendre:** arròs i pastes, patates, brous, carns i peixos a la planxa o bullits, formatges durs, torrades o galetes sense fibra, pa torrat, sucros filtrats, infusions, te, cafè i begudes sense gas.
 - **No pot prendre:** amanides, verdures, llegums, fruita, carns i peixos amb salses, embotits, llet, greix, pastissos i begudes amb gas.
- ✓ El dia abans de la prova, poden Esmorzar abans de les 9h una infusió + torrada amb oli i per Dinar 1er plat caldo amb pasta petita o arròs bullit; 2n plat, ou dur o pit pollastre planxa. La resta del dia ha de seguir una dieta a base de líquids clars (aigua, infusions, sucros colats sense polpa o begudes isotòniques sense gas tipus Aquarius).
- ✓ A les 20h començar la preparació.
- ✓ Si té distensió o dolor abdominal, cal prendre la solució més lentament o, fins i tot, interrompre el tractament fins a la desaparició dels símptomes. totes les preparacions es poden acabar fins a 4h abans de la prova.
- ✓ Per a la prova s'ha d'estar almenys 4 hores en dejú sense líquids clars, no llet ni cap tipus de làctics.
- ✓ Si no feu una preparació correcta és molt probable que el resultat no sigui adequat i s'hagi de repetir la preparació per a una nova exploració.

Quins efectes adversos puc tenir?

EVACUANTE LAINCO simple®/CASENGLICOL per contenir butil hidroxianisol com a excipient, pot ser irritant d'ulls, pell i mucoses. En ocasions, poden aparèixer reaccions transitòries que cedeixen ràpidament (nàusees, plenitud abdominal, recargolament, vòmits i irritació anal. Rarament, hi ha reaccions al·lèrgiques (urticària, dermatitis i mucositat nasal abundant).